

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

7ème année N° 18

BULLETIN TECHNIQUE DE LA DLP 27-5-59 026193
STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

(AVEYRON. AUDE. GARD. HÉRAULT. LOZÈRE. PYRÉNÉES-ORIENTALES)

. MONTPELLIER - 16, Rue de la République - Tél. 72 58-72

3ème édition N° 6

25 Mai 1959.

AVERTISSEMENTS

CARPOCAPSE DES POIRES ET DES POMMES

(Zone III B)
Cévennes

Par suite du ~~maintien~~ constant de la température crépusculaire, un premier traitement est nécessaire sur les poiriers et pommiers à partir du 31 mai.

Nous recommandons l'utilisation de :

Arsenate de plomb : 80 gr d'arsenic par hl d'eau

Parathion méthylé : 30 gr de M.A. par hl d'eau

D.D.T. (produit à 50 % de M.A.) : 125 gr de M.A. par hl

Parathion éthylé : 25 gr de M.A. par hl d'eau

D.D.T. émulsion : 100 gr de M.A. par hl d'eau

Oléoparathion : 20 gr de M.A. par hl d'eau.

On peut également utiliser : E.P.N., Malathion, Lindane émulsion, D.D.D., Méthoxychlor, Méthylnaphtylcarbamate de sodium, Gusathion.

TAVELURE DES ARBRES FRUITIERS A PEPINS

(Zone III B)
Cévennes

Les pluies des 22 et 23 mai ayant lavé le traitement préconisé le 19 et créé des conditions favorables au développement de la maladie, on réalisera un traitement mixte à l'occasion du premier traitement contre le Carpocapse.

(Zone III A)
Conflent et
Vallespire

Réaliser un nouveau traitement contre la Tavelure. Sur pommier, utiliser le soufre micronisé pour éviter l'extension de l'oidium du pommier.

INFORMATIONS

(Zone III)

CULTURES DE POMMES DE TERRE, TOMATES, AUBERGINES

Réaliser un traitement anticryptogamique afin d'éviter l'extension du Mildiou (Phytophthora infestans).

Ajouter à la bouillie un insecticide approprié pour détruire le Doryphore.

OIDIUM DU PECHER

Des attaques graves sont observées sur fruits et plus rarement sur feuilles.

Il convient, sur les variétés sensibles, de faire et de répéter tous les 8 jours une pulvérisation de Soufre micronisé ou de diphényl crotonate plus mouillant.

ROUILLE SUR AIL, POIREAU

Cette maladie déjà installée dans des cultures s'étendra en raison des conditions climatiques favorables.

Faire des pulvérisations avec : Zinèbe, Zirame, TM.T., Bouillie bordelaise, Oxylchlorure de cuivre.

MILDIOU DE L'OIGNON

Il est prudent de traiter les semis et plantations avec : Bouillie bordelaise, Oxylchlorure de cuivre
Captane, Zinèbe, Zinèbe cuivre

P275

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux,
P. BERVILLE

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles,
L.L. TROUILLON

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles du Languedoc-Roussillon - 16, rue de la République à MONTPELLIER.

Le Gérant : TROUILLON. Autorisation du 6 mars 1956. Reproduction, adaptation réservées.